


B地区 I 区




- | | | |
|------------|-----------|------------|
| 1 ソメイヨシノ | 23 ナツツバキ | 54 サツキ |
| 2 カンヒザクラ | 25 ケヤキ | 56 ハナミズキ |
| 3 ジュウガツザクラ | 28 イロハモミジ | 57 ヤマブキ |
| 7 ショウゲツ | 34 キンモクセイ | 66 ヤマボウシ |
| 11 ワカサギ | 39 ヒマラヤスギ | 83 ムラサキシキブ |
| 15 キブシ | 43 スギ | 86 ヒガンバナ |
| 22 ハリエンジュ | 46 アラカシ | |



1 ソメイヨシノ

開花期：4月
バラ科

落葉高木。代表的な園芸品種。桜の開花前線の指標となる。花弁は5枚。



2 カンヒザクラ

開花期：3月
バラ科

落葉中木。春早くから下向きに開花し、濃い緋色が名前の由来。花弁は5枚。



3 ジュウガツザクラ

開花期：10～4月
バラ科

落葉中木。八重咲き。10月頃に開花するのでこの名がある。花弁は10～15枚。



7 ショウゲツ

開花期：4月
バラ科

落葉中木。枝が横に広がるのが特徴。内側の花弁は白色。花弁は21～26枚。



11 ワカサギ

開花期：4～5月／10～11月
ツツジ科

半常緑低木。春と秋に開花する。キシツツジ系。雄しべは約10本。



15 キブシ

開花期：3～4月
キブシ科

落葉低木。早春に枝から黄緑色の花の穂を垂らす。雌株と雄株は別株。



22 ハリエンジュ

開花期：5～6月
マメ科

落葉高木。芳香のある白い花。北米原産で、明治時代に渡来した蜜源植物。



23 ナツツバキ

開花期：6～7月
ツバキ科

落葉高木。夏に咲くツバキの仲間。樹皮は赤褐色。別名：シャラノキ。



25 ケヤキ

開花期：4～5月
ニレ科

落葉高木。淡黄緑色の小さな花。研究・管理棟横に玉川学園第一の巨樹。



28 イロハモミジ

開花期：4月
カエデ科

落葉高木。暗赤色の雄花と両性花が咲く。葉は5～7裂。秋の紅葉の代表格。



34 キンモクセイ

開花期：9～10月
モクセイ科

常緑中木。花は芳香が強い。日本には雄株のみ渡来。中国原産。



39 ヒマラヤスギ

開花期：10～11月
マツ科

常緑針葉樹。大型の球果ができる。葉は車輪状にでる。ヒマラヤ地方の原産。



43 スギ

開花期：4月
スギ科

日本特産の常緑針葉高木。葉は針状でらせん状に着く。有名な建築材。



46 アラカシ

開花期：4～5月
ブナ科

常緑高木。花は4～5月。葉は硬く、上半分に大きな鋸歯がある。



54 サツキ

開花期：5～6月
ツツジ科

常緑低木。小型で紅紫色の花。多くの園芸品種。開花期が旧暦の「皐月」。



56 ハナミズキ

開花期：4～5月
ミズキ科

落葉小高木。アメリカ原産。総苞片そうほうぺんが花弁状となる。



57 ヤマブキ

開花期：4～5月
バラ科

落葉低木。明るい黄色の花。株立ちとなる。八重咲きもある。



66 ヤマボウシ

開花期：5～7月
ミズキ科

落葉高木。白い総苞片そうほうぺんが葉の上に広がる。果実は赤く熟し、可食。「山法師」の意。



83 ムラサキシキブ

開花期：6～7月
クマツヅラ科

落葉低木。淡紫色の花で、秋には紫色の果実。「紫式部」の意。



86 ヒガンバナ

開花期：9月
ヒガンバナ科

古い時代に中国から渡来した多年草。秋の彼岸頃に真赤な花。鱗茎りんけいに有毒。